

FICHA TÉCNICA

FUNGISDIN Aerosol

Miconazol

Sin gas propelente

Composición

Cada comprimido contiene:

Miconazol (DCI)..... 8,7 mg

Excipientes: capro-caprilato de glicerol y polioxietilenglicol, polietilenglicol 300 y alcohol 99,8% MEC, cs

Propiedades

El principio activo de Fungisdin es el fármaco sintético Miconazol, antimicótico de amplio espectro, activo a la vez frente a dermatofitos y levaduras, que ejerce asimismo una potente acción bactericida frente a bacterias gram positivas.

Indicaciones

Dermatofitias: Tinea pedis (pie de atleta), T. corporis, T. cruris (eczema marginado de Hebra), T. manuum, T unguium (onicomicosis), T barbae.

Candidiasis: Intétrigos, lesiones perianales, onixis y perionixis, estomatitis angular (perleche, quelitis), balanopostitis.

Micosis provocadas por hongos diversos: Pitiriasis versicolor. Infecciones y sobreinfecciones por bacterias gram positivas.

Posología

1 ó 2 aplicaciones al día, sobre la zona a tratar.

Contraindicaciones

No se han descrito

Precauciones

No debe pulverizarse sobre ojos o heridas. Esta especialidad por contener alcohol con indicador, no podrá ser ingerida ni ponerse en contacto con las mucosas.

Interacciones

No se han descrito.

Efectos secundarios

No se han registrado irritaciones, molestias o sensibilizaciones dérmicas.

Normas para la correcta administración

Infecciones cutáneas:

Aplicar el aerosol y friccionar suavemente hasta hacerlo penetrar completamente en la piel.

Duración del tratamiento: de 2 a 5 semanas.

Infecciones ungueales:

Recortar la uña; aplicar el aerosol sobre la unión una sola vez al día, seguido de la colocación de un vendaje oclusivo hasta la curación completa (de 1 a 2 meses).

Intoxicación y su tratamiento.

En la práctica es muy improbable que en la administración por vía tópica se produzcan intoxicaciones.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20

Presentaciones

Envase de 50 y 125 ml.

CON RECETA MÉDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Fabricado por:

Laboratorios Dr. Esteve, S.A

Laboratorios Isdin SA

Diagonal 520

Barcelona 08006